

2021.01.20

新生部リタッチ(2~3cm)の薬剤の調合と塗布

グレー比率	LUC※1	オキシ※2	FHE※3	BB5	色味のパウダー ※4	グールージュレ
0~50%未満	30 g	60 g	9ml	9 g	9 g	18 g
50~100%未満				12 g	6 g	
100%				18 g	0g	

- ※1 既染部の明度に合わせます 基本はLUC8です。
- ※2 求める明度に合わせてオキシを調合します。 基本は4.5%です。
- ※3 FHEはフルーツハーブエッセンスの略です。
- ※4 他の色味を混ぜてもOK (おすすめはブラウンディライト)

3%	←	4.5%	→	6%
暗め		3%+6%		明るめ
白髪多い		(1:1)		白髪少ない

20分~25分自然放置→プレリードウォーター噴霧→
既染部にリタッチ薬剤コーミング→5分放置→シャンプー

既染部の薬剤の調合と塗布

- 褪色している場合、ハリコシ艶が欲しいはパウダーを調合します。

色味のパウダー	お湯(3倍)	ヘアグールージュレ
ショート (30 g)	90 g	30 g
ミディアム (50 g)	150 g	50 g
ロング (70 g)	210 g	70 g

※パウダーを塗布する前にプレリードウォーターでクシ通りを良くしましょう。

リタッチ塗布後直ぐに既染部塗布 (リタッチの薬剤を引っ張らない様に) →30分自然放置→シャンプー

- 暗くしない、カラーチェンジの場合の調合はLUCとオキシを使います。

LUC ※1	オキシ ※2 (LUCの2倍)	FHE (LUC+オキシの 10%)	色味のパウダー (LUC+オキシの 20%)	ヘアグールージュレ (パウダーと同量)
ショート (40 g)	80 g	12ml	24 g	24 g
ミディアム (70 g)	140 g	21ml	42 g	42 g
ロング (100 g)	200 g	30ml	60 g	60 g

リタッチ塗布後直ぐに既染部塗布 (リタッチの薬剤を引っ張らない様に) →30分自然放置→シャンプー